


ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОЛИКЛИНИКА БАРСЕЛОНЫ БОЛЬНИЦА БАРСЕЛОНЫ



Свяжитесь с доктором Вафиком Аль-Ваттаром
(DR. WAFIK AL-WATTAR).

Телефон мобильный: +34607667856

E-mail: wafik12470@gmail.com

Хирургические вмешательства Больница Барселоны

Информация для пациента

- Не принимать препараты типа аспирина за 24 часа до операции
- Рекомендуется прием ENEMA Casen, накануне операции вечером и на
- В случае, если ENEMA Casen не применяется, использовать MICRALAX по 1 тюбику каждые 12 часов накануне исследования или операции
- Если Вы принимаете антикоагулянты, необходимо предупредить об этом за неделю до операции
- Вопросы и комментарии оставляйте, пожалуйста доктору Вафик Аль-Ваттару по e- mail: wafik12470@gmail.com



хирургические вмешательства

Больница Барселоны

Предоперционная анкета

Фамилия, имя, отчество: _____

Возраст: _____ Пол : _____ Номер телефона: _____

E-mail: _____

Адрес: _____

Город _____ Почтовый индекс : _____ Страна _____

Аллергические реакции : _____

Вредные привычки (курение, наркотики, алкоголь, кофе) : _____

Принимаемые медикаменты (анксиолитики , седативные, стероиды) : _____

Наличие проблем со свертываемостью крови (правильная, синяки ,
носовые кровотечения) : _____

Семейные заболевания : _____

Перенесенные заболевания (инфекционные, хирургические ,
гинекологические, легочные проблемы, гепетиты, гипертензии,
диабет) : _____

Физическое состояние : _____

- Сердце : _____

- Легкие: _____

- Брюшная полость : _____

Я не скрыл(а) никакой медицинской информации или аллергии

Подписи пациента и врача

Дата: _____ / _____ / _____

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА.
WM HOSPITALS.
HOSPITAL DE BARCELONA

ПОСТОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ЛЕЧЕНИЕ.

Gelocatil 650мг каждые 6 часов для снятия боли .

Упаковка CIPROFLOXACIN 500мг 10 таблеток. Принимать 1 таблетку каждые 12 часов.

600мг Espidifen , капсулы, по одной каждые 8 часов.

Промывание теплой соленой водой (3 столовые ложки теплой воды с олюю небольшой концентрации)

EMLA, крем, 30 грамм, две обработки в день, внутри и снаружи анального отверстия , при болях.

Упаковка ESTIMULINA (мазь), 2 обработки в день после теплого промывания или мазь CICATRAL , 2 раза в день, или GREEN CLAY (мазь) , 2 раза в день.

Omeprazole , в течение одного дня для профилактики раздражения желудка

CICATRIDINA супозитории 10 штук , одну на ночь при расстройствах или кровотечении. Если анальное кровотечение продолжается, приобретите устройство HEMO-RITE. – wafik12470@gmail.com

РЕКОМЕНДАЦИИ

Избегать применения таких лекарств как аспирин или кодеин. Вы можете испытывать некоторый дискомфорт 1-2 дня, но не нужно прекращать свои повседневные дела. Тем не менее рекомендовано не поднимать тяжести и избегать физических нагрузок в течение 7 дней. В случае запора придерживайтесь диеты, содержащей большое количество пищевых волокон (овощи, фрукты, злаки), пейте много жидкости (около 8 стаканов в день), ни в коем случае не применяйте слабительное или регуляторы функции кишечника. Важно избегать сильного слабительного, поскольку его применение может привести к диарее или раздражению стенок кишечника. В случае метеоризма примените средство AERO –RED, которое можно приобрести в любой аптеке. Небольшое кровотечение сразу после операции является нормальным. Это может случаться на протяжении 3-4- недель и быть непродолжительным и необильным, и как только прекратится, прекратятся неудобства связанные с гигиеной. В случае если кровь не останавливается или кровотечение становится всё более обильным, обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Хирургические вмешательства
Больница Барселоны

Анализы, которые необходимо сделать перед операцией

1. анализ крови

Общий анализ крови

Тест на свертываемость

Время активации протромбина

2.ЭКГ

3. Флюорография

Хирургические операции
Поликлиника Барселоны
Больница Барселоны
WM HOSPITALS.

Поступления

Имя пациента:

Добро пожаловать в амбулаторию, где используется лечение
геморроя по технологии DGHAL

А) время и дата предварительно согласовываются с доктором
Вафиком Аль-Ваттаром

Б) этот документ доставляется для ресепшена по прибытии в клинику
в Барселоне

Policlínica de Barcelona.

Calle Guillermo Tell, 4. 08006 Barcelona. Spain.

Phone: + 34.93. 4161616. Fax. + 34. 93. 2184448.

История болезни

Фамилия, Имя, Отчество:

Дата рождения: ____ / ____ / ____

Дата поступления: ____ / ____ / ____

Жалобы: _____

БОЛЬ, ОТЕК, ЗУД, УВЕЛИЧЕНИЕ, КРОВОТЕЧЕНИЕ, ВЫДЕЛЕНИЯ

другие : _____

• Первичный осмотр :

• Предварительное лечение:

• Анамнез :

• Показания к операции:

• Наличие аллергии :

• Принимаемые препараты :

Потеря веса, усталость, измененное состояние кишечника, боль в животе, запор, диарея

Другое :

Сигмоидоскоп, проктоскоп перианально на: ____ см

Мужчина. (простата) :

Женщина (мочеполовое) :

Диагноз:

Геморрой, ушибы, бородавки, свищ или полипы промежности, трещина

Другое :

ПРОЦЕДУРА: (DGHAL) перекрытие геморрагированных артерий аппаратом Допплера

хирургические вмешательства
WM HOSPITALS.
HOSPITAL OF BARCELONA.

СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ГЕМОРРОЯ ТЕХНИКОЙ (DGHAL)

Общая стоимость удаления геморроя методикой (DGHAL) оплачивается наличными в ЕВРО при предварительном посещении клиники или в клинике перед операционным вмешательством.

Оплата в размере 5000 ЕВРО производится доктору Вафику Аль-Ваттару

Если вы состоите в сообществе Mutual- Assurance, будет необходимо подтверждение этого факта, и тогда сообщество покроет стоимость пребывания в клинике и другие расходы согласно Вашим условиям, что уменьшит для Вас цену операции



РАЗМЕЩЕНИЕ

Для размещения в период пребывания в Барселоне мы рекомендуем остановиться в гостинице Hotel Guillermo Tell, рядом с поликлиникой Барселоны (Policlínica de Barcelona) на то же улице

-Сайт гостиницы Hotel Guillermo Tell:

<http://www.hotelguillermotell.com/en>

-E-mail для контактов : info@hotelguillermotell.com

-Телефон: +34 93 415 40 00