**Dr. Wafik Al-Wattar**
Colegiado 12.470
**Especialista en Urología, Sexología y Andrología**
Licenciado en Medicina y Cirugía, Medicina Natural y Preventiva
Miembro de la Sociedad Española de Urología
Miembro de la Sociedad Española de Andrología
Miembro de la Internacional Society of Andrology
www.drwafikalwattar.com

# Cirugía ambulatoria

## FIMOSIS O CIRCUNCISIÓN

En un principio, en la comunidad judía y musulmana, se recomienda practicar la circuncisión a todos los varones al nacer. En occidente se están concienciando cada vez más de que hacer la fimosis es más higiénico y con ello se evitarán las infecciones provocadas por hongos, por alergia o por alteraciones metabólicas e incluso cabe la posibilidad de evitar el cáncer de cuello uterino en la mujer, ya que de esta forma nunca existe el aumento de liquen responsable de las neoformaciones. Lo más positivo es que se puede practicar a cualquier edad.

La mayoría de los diabéticos no operados de fimosis, padecen balanitis diabética. Esto quiere decir que la piel se cierra y es imposible poder orinar, por lo que llegado este caso, será necesario practicar la fimosis urgentemente.

Primeramente, el paciente deberá acudir a una visita con el especialista para confirmar el diagnóstico médico de la fimosis. En el caso de que quede confirmado, se concertará hora y día para practicar la intervención, la cual se realizará en una hora y con anestesia local; no requiere hospitalización, pudiendo realizar vida normal a partir del día siguiente y al cabo de ocho días los puntos caerán por sí mismos.

**Preparación:**

- Acudir a la operación con la digestión hecha.
- Si es una persona nerviosa, tomar algún tranquilizante (Valeriana), tranxilium 5mg o feldene flax.

**Consejos postoperatorios:**

- Mantener el vendaje compresivo como mínimo 2 días.
- Retirar el vendaje mojándolo con agua de tomillo o manzanilla.
- Curas diarias con betadine solución 2 veces al día.
- Tomar antiinflamatorio como ibuprofeno 600mg una capsula cada 8 horas como mínimo 3-5 días.
- Si tiene dolor tomar nolotil ampollas bebibles.
- Para la sensibilidad del glande se puede aplicar una crema llamada EMLA 30g que tiene anestesia.
- Para evitar las erecciones espontáneas tome NARINE grageas 2 juntas antes de acostarse.

El precio de la primera visita es de **120€**
El precio de la intervención es de **600€**




**Dirección consultorio clínico Rubí:**
**Plaça del progres, Nº2 edificio A, entlo.1ª (Plaza progreso)**

Para cualquier duda llame al 607667856 o vía email: wafik12470@gmail.com
También puede contactar por WhatsApp: +34628920972